

► **LÆSERTEST: HÅNDHYGIEJNE I HJEMMEPLEJEN.** Det korrekt udfyldte spørgeskema fra *Sygeplejersken* nr. 11/2005 ser sådan ud:

Udsagn	Rigtigt	Forkert
Mikroorganismer i patientens eget hjem er altid uskadelige for patienten selv.		X
Smitte med diaré kan ikke reduceres ved håndvask.		X
Håndvask har kun lille effekt på antallet af mikroorganismer.		X
Glycerol i hånddesinfektionsmidler hæmmer den baktericide effekt.		X
Hånddesinfektionsmiddel tilsat glycerin er mildere mod hænderne end vask med vand og sæbe.	X	
Der skal anvendes mindst to ml håndsprit for at desinficere hænderne i tilstrækkelig grad.	X	
Ved brug af håndsprit skal hænderne viftes tørre.		X
Hånddesinfektion med sprit og glycerin må aldrig foretages inden øjendrypning.		X
Ethanol er kun delvis effektivt som desinfektionsmiddel over for visse vira.	X	
Fast håndsæbe skal være ophængt i magnet ved håndvasken.	X	
Håndsæbes pH er vigtigere for reduktion af den mikrobielle flora ved håndvask end mekanisk bearbejdning.		X
Helt glatte vielsesringe forhindrer effektiv håndvask.	X	
Effektiv håndvask forudsætter mekanisk bearbejdning af hele håndens overflade med vand og sæbe i mindst 15 sekunder.	X	
Efter håndvask skal hænderne trykkes tørre, der må ikke gnides.	X	
Håndklæder af frotte må bruges flere gange af sygeplejersken, hvis de ikke hænger sammen med patientens håndklæder.		X
Håndcreme til sygeplejerskens hudpleje skal være fedtfri.		X
Håndvask eller hånddesinfektion foretages før og efter brug af engangshandsker.	X	
Bruges bomuldshandsker under engangshandsker, skal bomuldshandskerne lægges til vask, når engangshandsken tages af.	X	
I patientens eget hjem er det unødvendigt at bruge sterile handsker ved invasive procedurer. Rene handsker er tilstrækkelige.		X
Hygiejnestandarder indeholder ikke krav vedrørende håndhygiejne, kun anbefalinger.		X