

## Pressenotat – Sygeplejersker og mundbind


MEGAFON har i perioden 2. til 10. december 2020 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråds medlemspanel. Spørgeskemaet blev sendt ud til alle 3.662 paneldeltagere, hvoraf 2.555 – svarende til 70 % - svarede. Nedenstående resultater bygger på besvarelsenerne fra paneldeltagerne i beskæftigelse.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er nedenstående:

1. Stort set alle sygeplejersker (95%) bruger mundbind i forbindelse med deres arbejde.
2. Af dem oplever to ud af tre (68%) gener i forbindelse med brugen af mundbind. Det svarer til, at 65% af alle sygeplejersker i beskæftigelse oplever gener i forbindelse med brug af mundbind i forbindelse med deres arbejde.
3. Hver femte sygeplejerske (19%) som oplever gener ved brugen af mundbind i arbejdet er i høj grad påvirket af disse. Det svarer til, at ca. hver tiende af alle sygeplejersker i beskæftigelse i høj grad er påvirket af gener i forbindelse med brugen af mundbind.
4. Blandt sygeplejersker som oplever gener ved brugen af mundbind er de mest udbredte gener hudproblemer (58%), hovedpine (58%) og åndedrætsbesvær (42%).

Samlet bruger stort set alle sygeplejersker i beskæftigelse (95%) mundbind i forbindelse med deres arbejde.

Figur 1. Bruger du mundbind ifm. arbejdet?




Anm.: n = 2.294 sygeplejersker i beskæftigelse. Data er vægtet. "Ved ikke" (0%) udeladt af figuren. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON december 2020.

To ud af tre sygeplejersker (68%), som bruger mundbind i forbindelse med deres arbejde, svarer, at de oplever gener ifm. brug af mundbind.

Det svarer til, at 65% af alle sygeplejersker i beskæftigelse oplever gener i forbindelse med brugen af mundbind<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Andel sygeplejersker som bruger mundbind i arbejdet: 95%. Andel af disse som oplever gener ved brugen af mundbind ifm. arbejdet: 68%. Andel af alle sygeplejersker i beskæftigelse som oplever gener i forbindelse med brug af mundbind i deres arbejde:  $0,95 * 0,68 = 0,65 = 65\%$ .

**Figur 2. Oplever du gener i forbindelse med brugen af mundbind?**




Anm.: n = 2.166 sygeplejersker i beskæftigelse som bruger mundbind i forbindelse med deres arbejde. Data er vægtet. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON december 2020.

2 ud af 3 sygeplejersker (67%) som oplever gener ved brugen mundbind angiver, at de "i høj grad" (19%) eller "i nogen grad" (48 %) er påvirket af disse. Ca. hver tredje (30 %) kun i mindre grad er påvirket og 2% "slet ikke" eller "næsten ikke" påvirket.

Det svarer til, at ca. hver tiende af alle sygeplejerske i beskæftigelse (12 %) i høj grad er påvirket af gener i forbindelse med brugen af mundbind<sup>2</sup>.

**Figur 3. I hvilken grad er du påvirket i dagligdagen af dine gener ved brugen af mundbind?**




Anm.: n = 1.420 sygeplejersker i beskæftigelse som oplever gener i forbindelse med brug af mundbind i deres arbejde. "Ved ikke" (0%) udeladt er udeladt af figuren. Data er vægtet. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON december 2020.

De mest udbredte gener, som sygeplejersker oplever ved brugen af mundbind, er hudproblemer og hovedpine (begge angivet af 58% af sygeplejerskerne oplever gener ved brugen af mundbind ifm.

<sup>2</sup> Andel sygeplejersker som bruger mundbind i arbejdet: 95%. Andel af disse som oplever gener ved brugen af mundbind ifm. arbejdet: 68%. Andel af disse som i høj grad er påvirket af generne: 19%. Andel af alle sygeplejersker i beskæftigelse som i høj grad er påvirket af gener ved brugen af mundbind:  $0,95 * 0,68 * 0,19 = 0,12 = 12\%$ .

arbejdet). Åndedrætsproblemer angives af lidt færre (42%), mens gener som eksem, migræne, forværring af eksisterende hudsygdomme og hudafskrabninger angives af 10% eller færre.

**Figur 4. Hvilke gener oplever du ved brugen af mundbind?**



Anm.: n = 1.420 sygeplejersker i beskæftigelse som oplever gener i forbindelse med brug af mundbind i deres arbejde. "Ved ikke" (0%) og "ingen af ovenstående" (1%) er udeladt af figuren. Data er vægtet. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON december 2020.

#### Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført i Dansk Sygeplejeråds medlemspanel. Panelet drives af MEGAFON, som rekrutterer paneldeltagere blandt tilfældigt udtrukne erhvervsaktive medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.

Undersøgelsen resultater vægtes, så deltagerne ligner Dansk Sygeplejeråds erhvervsaktive medlemmer som helhed på faktorerne alder, køn og geografi.

Spørgsmål til undersøgelsen eller medlemspanelet kan rettes til konsulent i DSR Analyse, Simon Martin Hansen, [sha@dsr.dk](mailto:sha@dsr.dk), 46 95 41 22.